

## HODOWCO CZY WIESZ, ŻE:

- wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy,
- przeżywalność wirusa wynosi: - 5 miesięcy w chłodzonym mięsie, - 300 dni w szynce parmeńskiej, - 6 miesięcy w szpiku kostnym, - 18 tyg. we krwi i zwłokach świń (w temperaturze pokojowej), - 280 dni w zakopanej w ziemi (w śledzionie),
- ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia,
- okres inkubacji choroby to 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni). Pierwszym objawem choroby jest gorączka 41° - 42°C,
- do zakażenia zwierząt dochodzi poprzez: przewód pokarmowy, drogi oddechowe, uszkodzoną skórę, odbyt, oraz poprzez krycie,
- rezerwuarem wirusa mogą być: dziki europejskie, dzikie świnie afrykańskie, guźce, kleszcze,
- ASF jest chorobą nieuleczalną. Nie ma na nią szczepionki.

**Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. WARUNKIEM JEGO WYPŁATY JEST JEDNAK PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI !!!**



Wielkopolska  
Izba Rolnicza

**Wielkopolska Izba Rolnicza**

ul. Gołęcińska 9e, 60-626 Poznań

tel. 61 227 01 30, e-mail: sekretariat@wir.org.pl

**Kontakt do Biur Powiatowych: [www.wir.org.pl](http://www.wir.org.pl) w zakładce Biura WIR**